

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN

DER

KONINKLIJKE AKADEMIE

VAN

WETENSCHAPPEN.

Afdeeling NATUURKUNDE.

VIJFTIENDE DEEL.

AMSTERDAM,

C. G. VAN DER POST.

1863.



OVER DE
CYCADEËN IN NIEUW-HOLLAND.

DOOR

F. A. W. M I Q U E L.



Hebben de belangrijke reizen, die in de laatste jaren naar de onbekende binnenlanden en naar de noordelijke streken van Nieuw-Holland door MITCHELL, LEICHARDT, GREGORY, FERD. MUELLER, OLDFIELD, STUART en anderen ondernomen werden, over de Flora van die gewesten veel licht verspreid, aanzienlijk waren vooral de aanwinsten onzer kennis van de orde der Cycadeën. — Door de welwillende toezending van voorwerpen ben ik in staat gesteld, aan de Akademie een overzigt van die ontdekkingen mede te deelen, waardoor niet alleen de verspreiding dier gewassen wordt opgehelderd, maar ook geheel onbekende vormen aan het licht gebracht worden, die op sommige punten eene wijziging in de classificatie noodzakelijk maken.

In het begin van onze eeuw was slechts eene Cycadee van Nieuw-Holland bekend, *Zamia spiralis*, door SALISBURY beschreven. R. BROWN, die FLINDERS expeditie als Botanist vergezelde, beschreef in 1810 twee nieuwe soorten van het geslacht *Cycas*, uit de noordelijke streken van Nieuw-Holland. In mijne Monographie beschreef ik eene aan *Zamia spiralis* verwante soort, door Fransche reizigers in het Swan-

rivier-gebied ontdekt en vereenigde beide onder het geslacht *Macrozamia*.

De aldus bekend geworden vier soorten bleven tot in den jongsten tijd de eenige vertegenwoordigers der Cycadeën in Nieuw-Holland, en toen ik voor eenige jaren een overzigt der geheele orde, die door ontdekkingen in Zuid-Afrika en vooral in Mexico eene zoo aanzienlijke uitbreiding verkregen had, samenstelde (*Prodromus Systematis Cycadearum*), kon ik slechts met een enkel woord gewag maken van de nieuwste ontdekkingen, die op hetzelfde tijdstip door FERD. MUELLER in zijne *Fragmenta Phytographiae Australiae*, te Melbourne uitgegeven, bekend werden gemaakt. Thans met volledige bouwstoffen toegerust, kan ik tevens de vraag over de vaststelling der geslachten *Macrozamia* en *Lepidozamia* nader toetsen.

Het is bekend, dat LEHMANN van het geslacht *Zamia* LINN. de Afrikaansche soorten, als een afzonderlijk geslacht, *Encephalartos*, heeft afgescheiden, waarin hij tevens *Zamia spiralis* opnam. Eene nadere vergelijking dezer soort en van hare aanverwante, die in westelijk Nieuw-Holland ontdekt was, deed een niet onbelangrijk verschil met de toen bekende Afrikaansche soorten kennen, weshalve ik de Nieuw-Hollandsche soorten als een afzonderlijk geslacht, *Macrozamia*, van de Afrikaansche vormen scheidde. Sedert echter zijn de bloemorganen van andere Afrikaansche soorten bekend geworden en de onlangs ontdekte nieuwe soorten van Australië verschillen van de oorspronkelijke *Macrozamiae* in meer dan een opzigt. Eene nieuwe vergelijking der beide geslachten is daardoor noodzakelijk geworden. Wilde men beiden behouden, dan zouden hunne karakters moeten gewijzigd worden en een derde zou voor eene afzonderlijke soort van Nieuw-Holland moeten worden vastgesteld. Ik zie in eene zoodanige vermeerdering der geslachten geen voordeel voor de wetenschap, en wanneer ik daarbij in aan-

merking neem, dat de bloemorganen van onderscheidene *Encephalartia* nog onbekend zijn, schijnt het geraden, aan het geslacht *Encephalartos* eene eenigzins ruimere beteekenis te geven, en het in ondergeslachten te verdeelen.

Is op die wijze dit geslacht èn in Zuid-Afrika èn in een groter deel van Nieuw-Holland door talrijke soorten vertegenwoordigd, in landstreken dus, die op grooten afstand door de zee van elkander gescheiden zijn en waarbij de tusschenliggende eilanden geene soorten van dit geslacht bezitten, erkennen wij daarin een eigenaardigen band tus-schen twee Flora's, die overigens geheel verschillend, slechts zwakke analogiën in enkele natuurlijke orden aanbieden. Het schijnt mij toe, dat deze verwantschap, die eene der oudste typen van het plantenrijk betreft, haren oorsprong heeft van een vroeger tijdvak, waarin deze groep eene meer algemeene verspreiding had.

Het geslacht *Lepidozamia*, door REGEL op eene soort gegrond, waarvan het vaderland en de bevruchtingsorganen geheel onbekend waren, wordt door de nieuwere ontdekkingen op zijne ware plaats gebracht. Vóór de ontdekking toch van den zoo eigenaardigen *Encephalartos Denisonii* kon men niet gissen, dat haar vaderland in Australië moest gezocht worden.

De soorten van het geslacht *Cycas* vertegenwoordigen de Indische typen in de Flora van het noordelijk gedeelte van Nieuw-Holland. De door R. BROWN aldaar ontdekte *C. angulata* en *C. media* werden door de uitmuntende afbeeldingen van FERD. BAUER beter bekend dan uit de zoo zeer beknopte beschrijvingen van den *Prodromus Florae Novae Hollandiae*. Eene derde soort, door ongedoornde bladstelen zeer afwijkend, vond ik in het Herbarium van Sir W. J. HOOKER, bij Port Essington ontdekt, maar eene scherpe om-schrijving dier soort was wegens de onvolledigheid der exemplaren niet mogelijk. Dezelfde of eene althans zeer

aanverwante soort ontdekte GAUDICHAUD op het eiland *Rawa*, maar ook van haar is niets bekend dan een oppervlakkige omschrijving. Eene belangrijke soort werd nu onlangs op den beroemden togt van GREGORY door het noordelijk gedeelte van Nieuw-Holland ontdekt, zoodat thans vier soorten dit geslacht in die gewesten vertegenwoordigen, meer dan in Indië en op den Indischen Archipel.

Stond aldus tot voor korte tijd Nieuw-Holland onder de landen, waar de Cycadeën zwak, slechts door vier soorten, vertegenwoordigd werden, thans is het getal reeds tot 10 gekomen en staat dit werelddeel niet meer achter bij die gewesten, waar deze groep zijne voornaamste zetels heeft.

CYCADEAE IN NOVA-HOLLANDIA HACTENUS DETECTAE.

CYCAS LINN.

a. *petiolis spinosis*.

1. CYCAS MEDIA R. BR. — *Nova Hollandia borealis*.
2. CYCAS ANGULATA R. BR. — *Ibidem*.
3. CYCAS GRACILIS MIQ. n. sp. Petioli utrinque spinulosi; rhachis dorso crasso-convexa, antice rectangulo-prominens; foliola densa linearia spinoso-acuta, marginibus incurvula, juniora subtus floccoso-pubera; squamae conimasc. anguste cuneatae, lamina sterili rufo-lanata apiceque brevi-spinosa terminatae; carpophylla gracilia praesertim versus apicem griseo-lanata, tri-tetragonoo-angulata, utrinque 4-3-ovulata, lamina sterili parva obovato-rhombea superne serrulata apice acutata.

Crescit in *Nova Hollandia* bor. orient. in regione flu-minis Burdikiu, prope Prom. Upstart: P. MUELLER.

Foliorum rhachi *C. angulatae*, carpophyllis *C. mediae* accedit. *Foliola* inferiora breviora, media 9—8 poll. longa, vix 2 lin. lata, firma, nervo medio utrinque prae-sertim subtus prominente et in apicem pungentem continuato, supra saturate viridia, subtus pallida et nunc hic illic indumento rufulo crispulo detergibili adspersa.

Semi masc. *Squamae* complures suppetunt pollice paullo longiores, angustiores quam in omnibus reliquis speciebus, parte pollinifera anguste cuneiformi, prae-sertim deorsum contracta, supra glabra, subtus antheris pallidis plerumque quaternatim aggregatis obtecta, parte sterili (lamina) triangulari in apiculum brevi-spinosum reflexo-rectum excurrente, pallide rufo-tomentella, crassiuscula, utraque facie secundum medium subcarinata, quam pars pollinifera triente breviore, vel in inferioribus subaequilonga.

Carpophylla ovalis vel seminibus instructa, habitu graciili et lamina sterili parva ab iis congenerum distincta, 7—7½ poll longa, tomento molli denso tenui pallido sensim exuendo, in parte superiore diutius persistente, obducta, e foveis lateralibus usque prope laminam obviis satis profundis utrinque *ovulis* 3—4 ellipsoideis angulatis glabris instructa, itaque 6—8-ovulata, apice abrupte in parvam laminam submuticam dilatata; haec enim apice vix in acumen distincte excurrit. *Semina* matura obovoideo-ellipsoidea glabra, sub pellicula succosa, putamine conformi lignoso, 1½ poll. longa.

b. *petiolis inermibus.*

4. CYDADIS species dubia, in *Nova Hollandia* bor. prope portum Essington collecta (*C. media* var. β mihi in *Prodr. Syst. Cycad.* p. 7 et 17).

ENCEPHALARTOS LEHM.

§ 1. *Macrozamia*. Folia (in sp. 1 et 2) vernatione spiraliiter torta, foliolis basi antrorum callo glanduloso quasi auriculata. Squamae masc. et fem. e vertice pungenti-acuminatae.

1. ENCEPHALARTOS FRASERI MIQ. *sub Macrozamia in Monogr. Cycad. p. 37.* (*Macrozamia Preissii LEHM* — *Encephalartos Preissii R. MUELLER*. — *Zamia spiralis FERD. BAUER Illustr. ined.* olim a me perperam ad *E. spiralem itata*).

Crescit in *Nova Hollandia austro-occid.* in regione *Swan-river*, ad *Sinum maris Geographorum*, *King George Sound*, *Esperance Bay*, secus *Freemantle*, caet., ab extrema parte occid. austr. usque ad 29° Lat. austr. In regione *Sinus Stokes Inlet MAXWELL legit.* Prope portum Lincoln, ubi in itinere Flindersiano indicatus est, hodie haud repertus est.

Observ. Hujus et sequentis speciei discrimen, mibi olim haud ab omni parte perspicuum, comparatis speciminiibus fructiferis, satis constat. In errorem incidi quum pulcherimas *BAUERI* tabulas ad sequentem retulerim.

2. ENCEPHALARTOS SPIRALIS LEHM. (*Zamia spiralis SALISB.* — *Z. spiralis R. BR.* quoad formam minorem in Australia orient. crescentem; forma majore enim superior species intelligitur. *Macrozamia spiralis MIQ. excl. tabb. Bauerianis in Monogr.* etiam pro parte repetitis).

Var. β major, foliolis numerosioribus (usque 160) distantioribus gracilioribus (*var. Miquelii MUELL.* qui heic formam agnoscit sub calidore coelo subtropico luxuriantem sed conspecificam).

Crescit in *Nova Hollandia orientali extratropica usque subtropica*, locis sterilibus *Novae Austro-Cambriae*, a *Sinu maris Broad-Sound et Moreton* (Lat. austr. $27^{\circ} 30'$), ad

Portum *Jackson*; prope *Jervis-Bay*: B. MUELLER; ad *Sinum Moreton*: STUART; inter *Mont-Bay* et *Broad-Sound*: herb. MUELLERI.

Observ. *Zamia tridentata* WILLD. (*Encephalartos tridentatus* LEHM. (cf. tab. meam in *Linnaeae Vol. XXI, tab. VI*) hujus vel alicujus affinis speciei forma juvenilis, foliis minoribus, foliolis paucioribus, angustioribus, apice tridentatis, probabiliter habenda. Planta hortensis, a WILLDENOVIO descripta, cuius specimen authenticum examinavi, capensis credita est ob similitudinem cum aliis speciebus e Prom. B. Spei allatis.

E. Fraseri.

Statura omnium partium major,

Truncus demum elatus cylindricus,

Folia longiora,

Foliola numerosiora, utrinque usque 70, densa, rigida, basi minus contracta, subtus nervis usque 15 notata, stomaticum zonis minus regularibus, adulta lanceolato-linearia, spinoso-acutata,

Conus masc. *pedunculo* crasso suffultus, elongato-cylindricus (*juvenilis ellipsoideus*) vulgo fere pedalis, aliquando adhuc longior, fusco-lanatus sensim glabrescens. *Squamae polliniferae* oblongo-cuneatae, 1—1½ poll. longae, in acumen pungens elongatum

E. spiralis.

perspicue minor.

humilis, ellipsoidens vel brevicylindricus.

breviora.

*minus numerosa, in var. β.
tamen usque 80 utrinque,
magis flexibilia, lucida, basi
contracta, inter nervos 8—10
stomatifera, angustiora, ver-
sus apicem magis attenuata.*

*multo minor, pedunculo tenuiore (pennae olorinae) suffultus, cylindricus, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ pedis longus. *Squamarum* apex minus elongatus, *corpo pollinifero* saepe $\frac{1}{2}$ brevior, in supremis tantum illud adaequans vel longior, spinoso-pungens, autice et postice*

excurrentes; areae polliniferae satis discretae, gibboso-tumens. *Squamae*
½· vix 1 poll. longae. Areae
polliniferae confluentes.

Conus fem. crasso pedunculo suffultus, pedalis, ellipsoideo-cylindraceus. Squamarum corpus peltatum compressum, basi cordatum, apice in acumen longum denticulatum vel integerrimum excurrens, maturum magis intumescens, sesquipedalis vel saepe brevior.
Squamae paullo pruinosa, corpore peltato pollice breviore subreniformi glaberrimo, in acumen pungens linearis-vel angusto-lanceolatum integerrimum diametro squamae aequilongum vel sublongius excurrente.

Semina magna, oblongo-ellipsoidea, 1 ½—2 poll. aequantia, minora, magis globoso-ellipsoidea, circiter pollicaria.

Adnot. Truncus E. Fraseri, prope Freemantle observati, gracilis, in regione King George-Sound vero valde abbreviatus visus, conos 2—3 proferens; ad Esperance-Bay 9—10 conos (masc.?) protulit, teste cl. F. MUELLER in litt. — Ad extremitatem occid. regionis Great Australian Bright specimina observata fuisse videntur truncis 20 pedes altis et totidem (?) in ambitu. An ejusdem speciei?

3. ENCEPHALARTOS OLDFIELDII MIQ. n. sp. (Macrozamia Preissii OLDF. herb., non LEHM.) *Truncus...; folia lanceolata rigida, plana, foliolis densis patulis, inferioribus et superioribus minoribus, rhachi semiteriti-trigonae dorso crasse convexae antice inter sulcos laterales obtuse productae concinne insertis, latiuscule linearibus plerunque falcatis spinoso-acutis, basi antrorum obsolete calloso-subincrassatis, deorsum angusto-decurrentibus (siccatis glaucentibus), supra enerviis, subtus 8—4-nerviis, marginibus incurvis; —? conus masc. illi E. spiralis similis.*

Crescit in Nova Hollandia austro-occid., in regione Swan-river, probabiliter in regionibus interioribus: OLDFIELD.

Speciem distinctam esse, dubium haud videtur. Foliorum basi vix callosa a duobus superioribus primo adspectu discernitur. An conus masc. ex eodem specimine carpitas sit, in schedula haud indicatum est, verisimile tamen videtur. — Foliiis *Diooni eduli* et *Enc. Pauli Guilielmi* quodammodo accedit, coni autem structura ab hac specie valde differt. — *Rhachis folii calami* scriptorii orassitiae obtuso-tetragona, dorso praesertim incrassata, antice magis depressa sed inter foliolorum insertionem prominula. *Foliola* 5—4 $\frac{1}{2}$ poll. longa. 2—1 $\frac{3}{4}$ lin. lata, rigida, crassa, in sicco supra convexa, subtus concavo-canaliculata, basi parum angustiora, apice parum contracto spinoso-acuta, suprema valde abbreviata et angustiora.

Conus masc. ab illo E. Fraseri mole multo minore pendunculoque elongato valde diversus. *Pedunculus* 8 $\frac{1}{2}$ poll. longus subcylindricus leviter angulatus, sursum pedetentim incrassatus, nunc glaber, sub cono leviter pilosulus. *Conus* oblongo-ellipsoidens, fere 4 $\frac{1}{2}$ poll. longus, 2 $\frac{1}{2}$ crassus, fere maturus, sed antherae adhuc clausae, *squamis* arcte imbricatis, infimis abbreviatis muticis, reliquis spinoso-acutatis, superiorum acumine longiore. *Squamas* mediae cuneatæ compressae durae, e corpore pollinifero in laminam sterilem ovato-subtriangularem apice reflexo spinosam terminatae, 10—11 lin. longae, 5 latae.

§ 2. *Lepidozamia* (REGELIO genus. Cf. *Prodr. Syst. Cycad.* p. 10). Folia vernatione recta, foliolis lata basi seriebus in antice rhacheos facie valde approximatis sub-contiguis insertis, basi haud callosis. Coni squamae haud in acumen excurrentes.

4. ENCEPHALARTOS DENISONII F. MUELLER, in *Transact. Pharm. Soc. of Victoria* II, p. 90. (*Macrozamia Denisonii* MOORE et F. MUELL. in *Fragm. Phytopr. Austr.* I, p. 41). Truncus cylindrico-elongatus; folia longa, foliolis

numeriosis linear-i-lanceolatis falcatis, basi lata deorsum decurrente insertis, parallele plurinerviis, subtus praesertim inter nervos (in sicco fusco-) stomatoso-punctatis; coni masc. squamae cuneiformes, apice in corpus sterile securiformi-rotundatum tomentellum vertice saepe in brevem apiculum contractum expansae; fem. pedicellato-peltatae, pelta transverse compressa in brevem cuspidem coriaceam recurvam sericeo-velutinam excurrente, matura valde incrassata.

Crescit in *Nova Hollandia orientali extratropica australiore*, v. c. in regione fl. *Manning*: STEPHENSON; in distr. fl. *Burnett*: c. MOORE; in confinibus *Sinus Moreton*, in sylvis prope *Durando*: w. HILL; in tractu montium *Expedition-range* usque ad plagam altam *Buckland Tableland*, in jugis nemorosis basalticis, ad 1000—2000 ped. alt.: A. C. GREGORY.

Omnium spectatissima species. Truncus usque 18—20 pedum alt., cylindricus. *Folia* numerosa, 12—7 pedes longa, saturate viridia, lucida, *petiolis* 2—3-pedalibus basi valde incrassata fulvo-tomentellis, caeterum glabris, semicylindrico-tetragonis, dorso convexioribus; *rhachi* inferne sub-tetragona superne a lateribus compressa, antice utrinque sulco folioligero instructa. *Foliola* numerosissima, usque 240, densa, sed non imbricata, *rhachi* antice inserta, basi lata haud callosa, omnia falcata, inferiora opposita, superiora alterna, infima duplo breviora, superiora haud multum abbreviata, omnia circiter 6—8—10 poll. longa, $\frac{1}{2}$ lata, 12—15-nervia, coriacea, flexibilia, plana, supra astomatosa, subtus praesertim inter nervos tenues sed bene distinctos dense stomatosa.

Conus masc. valde elongatus, cylindricus, aliquando $3\frac{1}{2}$ pedes adaequans, ingentis cornu ad instar e foliorum corona emersus, utplurimum autem oblongo-ovoideus, $\frac{3}{4}$ —1 pedes longus, 4—7 poll. crassus. *Squamae* $1\frac{1}{2}$ —3 poll. longae, parte extrorsum exserta indumento griseo-fuscescente

sericeo obductae, caeterum deorsum cuneiformi-compressae, supra glabrae, subtus *antheris* (locellis polliniferis) pallide fuscescentibus dense obtectae (areis confluentibus), marginibusque inflexis subcylindrico-canaliculatae, *corpore sterili* subsecuriformi-rhombeo apiculato basi transverse incrassato, apiculo centrali ipso coriaceo, in lateralibus squamis patente, in supremis reflexo; vertex ipse magis minusve transverse acutatus.

Conus feminineus sesquipedalis, ovoideus. *Squamae* pedicellato-peltatae, (pedicello angulato), cordato-reniformes transverse subalato-compressae, maturae tumentes et magis distincte peltatae, supra medium sericeo-velutinae, indumento cano-fusco, sensim in acumen breve (in lateralibus lamina brevius, in superioribus eam adaequans) coriaceum compressum recurvum aequaliter sericeo-velutinum productae, *foveis ovuliferis* (sub maturatione pedetentim profundioribus) profundis, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longae, 2—3 latae. *Ovula* glabra angulata papillata. *Squamae* infimae numerosae vacuae.

Semina saepe sesquipollucaria, pollicem circiter crassa, angulata, nunc sulcis latis exarata et hinc ohtusangula, in universum ellipsoideo-globosa, testa carnosa intus flavescente, *putamine* (endopleura) lignoso, poris hili copiosis.

Adnotatio. Huic quam maxime affinis (fere eadem) est *Lepidozamia Peroffskyana* REGEL, (in *Act. Mosquens. anni 1856* fuse descripta; cf. *Prodr. Syst. Cycad.* p. 10 et 23), tum habitu, tum rhacheos forma, foliorum insertione et structura atque stomatum dispositione. In speciminibus a REGELIO benevole mecum communicatis *folia* 6-pedalia, *petiolis* bipedalibus, *foliolis* numerosis, 12 poll. longis, $\frac{2}{3}$ latius, usque 10-nerviis, rectis vel saltem haud perspicue falcatis; flores incogniti. Revera unice differt foliolis angustioribus rectis, nervis paucioribus; quare quam ad specimen in Horto Petropolitano cultum juvenile descripscerit speciem, conspecificam esse crederem. — Specimina alia, adhuc

magis juvenilia, a cl. VAN HOUTTE ex hortis Anglicis advecta, olim *Lepidoramia minoris* nomine provisorie distinxii. Si perpendemus, E. Denisonii in *Nova Hollandia* variis locis esse inventum, sane haud miremur specimina, e seminibus in Europam advectis, exorta in caldariis nostris occurrere.

§ 3. *Parazamia*. Squamae utriusque sexus, masc. breviter, pedicellatae. Foliola basi vix callosa.

5 ENCEPHALARTOS PAULI GUILIELMI FERD.
MUELL. *Transact. Pharm. Soc. Vict.* II, p. 31. (*Macrozamia*
HILL et MUELL. *Fragm.* I, p. 86 et 243, II, p. 479). Humilis; petioli ad basin dense lanati; foliola densa numerosa (utrinque fere 80) anguste linearia acuta, basi subtetragona, sursum canaliculata, valide 5-nervia; coni glabri; squamae masculae e pedicello brevi cuneatae apice brevi-cuspidatae.

Crescit in *Nova Hollandia orientali australiore*, in regione *Sinus Moreton* rara: w. HILL; ad *Maitland* et in *Nova Anglia* 1000': MUELLER; in clivis arenosis rupestribus *Expedition-range*, ad 1200—1500 ped. alt.: A. C. GREGORY; in vicinitate fluminum *Mackenzie* et *Maranoo*: COBHAM; in *Nova Austro-Cambria interior.*: MOORE; Collitur in Horto Houtteano.

Teste cel. F. MUELLER rarissima species, quae foliis E. cycadifolium in mentem revocat, etsi statura humili et organorum genitalium indole ab illo longe remota sit. Specimina mihi transmissa inter se valde differunt; foliola enim in aliis breviora, rigidiora, in aliis multo longiora angustiora laxioraque; in novella stirpe apud VAN HOUTTE culta foliola pauca, distantia, basi parce pilosula.

Truncus subterraneus turgidus, vel spithameae altitudine epigaeus, dense cinereo-lanatus.

Folia 2—3-pedalia, vernatione et serius etiam subspiraliter torta, novella pilosa. *Petiolum* basi dense pallide

ochrascenti-lanatus, validus, subsemicylindrico-compressus, antica facie lata vix concavatus, dorso subtrigono-convexus; rhachis conformis vel subconformis

Foliola utrinque lateraliter inserta, serie utraque interjecta rhacheos facie dilatata satis distante, densa, utrinque usque 80, angusto-linearia, 6—10 poll. longa, 1—1½ raro 2 lin. lata, superiora et inferiora breviora, infima brevisima, spinuloso-acuta, integerrima (planta novellae apice paucidentula), subtus concavo-canaliculata, deorsum fere tetragono-canaliculata, ima basi subcylindrica, sed nullomodo auriculato-callosa, 5-nervia, nervis subtus prominentibus quasi sulcate-nervosa, colore in sicco caesio-glaucoscentia.

Conus masc. glaber. *Squamae* ex ima basi in *pedicellum* manifesto contracta in *corpus polliniferum* cuneato-rotundatum subrhombium dilatatae, apice *corpo sterili* in apiculum brevem spinoso-acutum erectum reflexum excurrente terminatae, 4—5 lin. longae totidemque circiter latae, *corpo pollinifero* supra concaviusculo, subtus convexo, *antheris* (locellis) sordide pallidis per aream apice bilobam dispositis.

Conus femineus semipedalis, *pedunculo* circiter quadripollicari, praeter basin attenuatam tomentosam glabro. *Squamae* pedicellato-peltatae, *pedicello* angulato demum compresso, *pelta* hemidiametro transversali breviore, *pelta* transverse dilatata, angulis lateralibus deorsum flexis semina subobtegentibus, vertice dilatato rhombeo e crista transversali acuta in brevem processulum spinosum reflexo-rectum excurrente.

Semina ellipsoideo-subglobosa, irregulariter vario medo obtusangula, pollicaria vel paullo majora, testa carnosa rubella, hilo ovali, *putaminis* lignosi area terminali seu micropylari sulculis circiter 11 (in reliqua ejus superficie longitrosis magisque obsoletis) notata.

Observe. Huic speciei adscripti specimina queaedam sub nomine *E. spiralis* missa, in *Nova Anglia* et ad *Maitland* collecta, nec non *formam foliolis bifidis bipartitis*, (potius 2 basi connatis), a cl. MOORE in *Nova Austro-Cambria int.* detectam, quae lusum potius quam constantem formam exhibere videntur. Foliorum structura, nervatio et color nullum obferunt discriminem.

§ 4. *Species incertae affinitatis.*

6. ENCEPHALARTOS MACDONELLI F. MUELL. *mes.* (*Macrozamia ej. mes. in Fragm. II, p. 170*). Foliola lan- ceolata-linearia sursum angustata acuta plana, marginibus subtus leviter laevigato-incrassatis, (haud incurvis), coriacea, utrinque concolora et dense stomatifera, subtus nervis 6 obsoletis notata, 2—8 poll. longa, 2 lin. lata, suprema multoties minora, basi latiuscula inserta, antrorsumque leviter callosa.

Nova Hollandia centralis, ad flumen *Neales* in *Macdonnell-range*, unde reportavit cel. perigrinator J. M. STUART.

Species certissima, foliorum structura facili negotio cognoscenda, sed conis incognitis affinitas obscura.