

SYLLOGE
PLANTARUM NOVARUM
ITEMQUE
MINUS COGNITARUM

A
PRAESTANTISSIMIS BOTANICIS
ADHUC VIVENTIBUS COLLECTA

ET
A SOCIETATE REGIA BOTANICA
— RATISBONENSI

EDITA.

TOMUS SECUNDUS.
CUM TABULA LITHOGRAPHICA.

RATISBONAE,
TYPIS VIDUAE C. E. BRENCK.
1828.

minali truncato-eroso sublobato, rachi ferruginea inermi. ḥ.

11. *Curculigo latifolia* (sumatrensis), foliis obovato-lanceolatis longissimis longitudinaliter plicatis, petiolo subtomentoso. — Scapus humilis intra folia enascens, tomentosus, compressus, spica ovata nutante; Bractee ovatae acutae, superne ciliatae. Corolla 6-petala flava, extus hirsuta. Filamenta brevia, antherae magnae, stylum includentes. (Fructus immaturus).

12. *Pitcairnia* (species). Foliis lineari-lanceolatis, apice triquetris crassis recurvis rigidis, margine spinosis.

13. *Pandanus latifolius*, fol. lineari-lanceolatis, margine rachique aculeatis: aculeis albis ḥ.

14. *Pandanus amaryllidifolius*, foliis lanceolatis integerrimis, apice spinoso-serratis, subtus glaucis. ḥ.

15. *Miranta bicolor*, foliis ovalibus depressis, antice obliquis obtusis, subtus discoloribus.

16. *Maranta gibba*, caule vaginisque pilosis, foliis subcordatis.

17. *Epidendrum aloifolium elongatum*, foliis linearibus oblique emarginatis.

18. *Epidendrum crithmifolium*, foliis teretibus comosis.

19. *Zamia horrida*, rigida, glauca, frondibus pinnatis: foliolis cuneatis trispinosis, spina

laterali squarrosa, inflexa. — Facies Eryngii! stipes villosus. ḡ.

20. *Zamia pygmaea*, frondibus pinnatis, foliis ovatis apice dentatis, conis ovatis sessilibus ferrugineis. ḡ.

21. *Zamia dentata* (an *tenuis*?) frondibus pinnatis, foliis linearibus alternis, apice spinosis. — ḡ.

22. *Pinus sumatrana*, foliis lanceolatis integerrimis glabris. ḡ.

23. *Cecropia digitata*, fol. digitato-lobatis, subtus tomentosus, utrinque scabris, lobis septem basi angustioribus antice ovatis acuminatis. ḡ.

24. *Piper incanum*, foliis subrotundocordatis subacuminatis carnosis glaucis canopilos. (Planta in caldaria vulgaris).

25. *Artocarpus parvifolia*, foliis panduraeformibus oblongis quasi trilobis: lobo intermedio acuminato maximo, lateralibus subacutis ḡ. — Rami teretes flexuosi.

26. *Combretum comosum*, fol. obovatis acuminatis, margine ciliatis.

27. *Logania (Evosma) latifolia*, fol. cordato-ovatis integerrimis. — Petioli ferruginei (ramenta Alni incanae.)

28. *Citrus Hystrix*, fol. crenatis, petiolo alato: alis magnitudine laminae ovatae. ḡ.

29. *Limonia microphylla* (folia Buxi apice emarginata, crenata).